

Prophylaxie de l'endocardite

pour les adultes à haut risque d'endocardite
infectieuse



Fondation Suisse
de Cardiologie

Active contre les maladies cardiaques et l'attaque cérébrale

L'endocardite (infection de la tunique interne du cœur) est une maladie rare, mais grave, causée par des bactéries. Vous avez un risque élevé d'endocardite. C'est pourquoi, avant une intervention dentaire ou un nettoyage professionnel par l'hygiéniste dentaire, vous devez vous protéger des infections à l'aide d'un traitement préventif qui consiste en une dose unique d'antibiotique (antibio-prophylaxie / prophylaxie de l'endocardite).

Madame Monsieur

Nom

.....

Prénom

.....

Date de naissance

.....

Maladie cardiaque / cardiopathie

.....

.....

Allergie à la pénicilline de type retardé*

(exanthème)

Oui Non

Allergie à la pénicilline de type immédiat**

(urticaire, angio-œdème, bronchospasme, anaphylaxie)

Oui Non

Médecin traitant-e

.....

.....

.....

Date

.....

Cette carte de prophylaxie de l'endocardite est personnelle et remplie par votre médecin. Montrez cette carte à toute personne qui s'occupe de vos soins:

- avant toute consultation dentaire / d'hygiène dentaire
- avant tout acte chirurgical
- avant tout examen endoscopique

Antibioprophylaxie avant intervention dentaire ou nettoyage professionnel par l'hygiéniste dentaire

L'antibioprophylaxie est recommandée en cas **d'intervention dentaire causant des saignements**, en particulier

- manipulations de la gencive ou de la région péri-apicale (endodontie)
- perforation de la muqueuse buccale lors d'actes de chirurgie dentaire

Pour l'antibioprophylaxie, la prise des médicaments suivants **une heure avant l'intervention** est conseillée :

Amoxicilline 2 g

Alternative en cas d'allergie à la pénicilline

- * Céfuroxime axétil 1 g p.o.
- ** Clindamycine 600 mg p.o.

Si le médicament ne peut pas être avalé

Amoxicilline 2 g i.v.

Alternative en cas d'allergie à la pénicilline, si le médicament ne peut pas être avalé

- * Céfazoline 1 g i.v. ou
Ceftriaxone 2 g i.v.
- ** Clindamycine 600 mg i.v. ou
Vancomycine 1 g i.v.

Antibioprophylaxie en cas d'autres interventions (opérations)

Les recommandations sont publiées sur le site <https://ssi.guidelines.ch> (→ Endocardite infectieuse/Prévention).

En cas de questions sur l'endocardite et l'antibioprophylaxie, veuillez vous adresser à votre cardiologue. Vous trouverez aussi plus d'informations à l'adresse www.endocardites.ch

Les recommandations ont été élaborées par la Société Suisse d'Infectiologie, la Société Suisse de Cardiologie, la Société Suisse de Cardiologie Pédiatrique et le Groupe suisse d'infectiologie pédiatrique.

www.sginf.ch
www.swisscardio.ch



**Fondation Suisse
de Cardiologie**

Active contre les maladies cardiaques et l'attaque cérébrale

Fondation Suisse de Cardiologie
Dufourstrasse 30
Case postale
3000 Berne 14
Téléphone 031 388 80 80
info@swissheart.ch
www.swissheart.ch
www.endocardites.ch